



2011-2012 Texas Minimum State Vaccine Requirements for Students Grades K-12

This chart summarizes the vaccine requirements incorporated in the Texas Administrative Code (TAC), Title 25 Health Services, Sections 97.61 to 97.72.

This chart is not intended as a substitute for consulting the TAC, which has other provisions and details. [Click here for complete TAC language.](#) The Department of State Health Services (DSHS) is granted authority to set immunization requirements by the Texas Education Code, Chapter 38, Health & Safety, Subchapter A, General Provisions.

IMMUNIZATION REQUIREMENTS

A student shall show acceptable evidence of vaccination prior to entry, attendance, or transfer to a child-care facility or public or private elementary or secondary school in Texas.

Vaccine Required (Attention to notes and footnotes)	Minimum Number of Doses Required by Grade Level				NOTES
	K - 2 nd	3 rd - 6 th	7 th	8 th - 9 th / 10 th - 12 th	
Diphtheria/Tetanus/Pertussis (DTaP/DTP/DT/Td/Tdap) ¹	5 doses or 4 doses	5 doses or 4 doses	3 dose primary series and 1 Tdap/Td booster <i>within last 5 years</i>	3 dose primary series and 1 Tdap/Td booster <i>within last 10 years</i>	5 doses of diphtheria-tetanus-pertussis vaccine; one dose must have been received on or after the 4 th birthday. However, 4 doses meet the requirement if the 4 th dose was received on or after the 4 th birthday. For students aged 7 years and older, 3 doses meet the requirement if one dose was received on or after the 4 th birthday. For 7th grade: 1 dose of Tdap is required if at least 5 years have passed since the last dose of tetanus-containing vaccine. For 8th - 12th grade: 1 dose of Tdap is required when 10 years have passed since the last dose of tetanus-diphtheria-containing vaccine. Td is acceptable in place of Tdap if a medical contraindication to pertussis exists.
Polio ¹	4 doses or 3 doses	4 doses or 3 doses	4 doses or 3 doses	4 doses or 3 doses	4 doses of polio; one dose must be received on or after the 4 th birthday. However, 3 doses meet the requirement if the 3 rd dose was received on or after the 4 th birthday.
Measles, Mumps, and Rubella ^{1,2} (MMR)	2 doses	2 doses	2 doses	2 doses	The first dose of MMR must be received on or after the 1 st birthday. For K - 2nd grade, 2 doses of MMR are required. For 3rd - 12th grade, 2 doses of a measles-containing vaccine, and one dose each of rubella and mumps vaccine is required.
Hepatitis B ²	3 doses	3 doses	3 doses	3 doses	For students aged 11-15 years, 2 doses meet the requirement if adult hepatitis B vaccine (Recombivax) was received. Dosage and type of vaccine must be clearly documented. (Two 10 mcg/1.0 ml of Recombivax).
Varicella ^{1,2,3}	2 doses	1 dose	2 doses	1 dose	The first dose of varicella must be received on or after the first birthday. For grades K - 2nd and 7th - 9th 2 doses are required. 1 dose is required for all other grade levels. For any student who receives the first dose on or after 13 years of age, 2 doses are required.
Meningococcal				1 dose	
Hepatitis A ^{1,2}	2 doses				The first dose of hepatitis A must be received on or after the first birthday.

¹ Receipt of the dose up to (and including) 4 days before the birthday will satisfy the school entry immunization requirement.

² Serologic confirmation of immunity to measles, mumps, rubella, hepatitis B, hepatitis A, or varicella or serologic evidence of infection is acceptable in place of vaccine.

³ Previous illness may be documented with a written statement from a physician, school nurse, or the child's parent or guardian containing wording such as: "This is to verify that (name of student) had varicella disease (chickenpox) on or about (date) and does not need varicella vaccine." This written statement will be acceptable in place of any and all varicella vaccine doses required.



Requisitos de Vacunación Mínimos Estatales de Texas de 2011-2012 Para Estudiantes de Kinder-12.º Grado

Este gráfico resume los requisitos de vacunación incorporados en el Código Administrativo de Texas (TAC), título 25, Servicios de salud, secciones 97.61 a 97.72.

El gráfico no tiene como propósito sustituir las consultas al TAC, el cual contempla otras disposiciones y detalles. Haga clic aquí para obtener el texto completo del TAC. El Código Educativo de Texas, capítulo 38, Salud y Seguridad, subcapítulo A, Disposiciones Generales, concede la autoridad de establecer requisitos de vacunación al Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas (DSHS).

REQUISITOS DE VACUNACIÓN

Los estudiantes deberán mostrar prueba aceptable de vacunación antes de entrar, asistir o ser transferidos a una guardería o escuela primaria o secundaria pública o privada de Texas.

Vacuna requerida (Vea las notas y las notas de pie de página)	Número mínimo de dosis requeridas por nivel de grado				NOTAS
	kinder-2.º	3 - 6.º	7.º	8 - 9.º 10 - 12.º	
Difteria, tétanos y pertussis ¹ (DTaP/DTP/D/Td/Tdap)	5 dosis o 4 dosis	5 dosis o 4 dosis	Serie primaria de 3 dosis y 1 dosis de refuerzo de la vacuna Tdap o Td en los últimos 5 años	Serie primaria de 3 dosis y 1 dosis de refuerzo de la vacuna Tdap o Td en los últimos 10 años	5 dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la pertusis; debe haberse recibido una dosis en o después del 4.º cumpleaños. Sin embargo, con 4 dosis se cumple con el requisito si la 4.ª dosis se recibió en o después del 4.º cumpleaños. Los estudiantes de 7 años de edad o más, con 3 dosis cumplen con el requisito si recibieron una dosis en o después del 4.º cumpleaños. Para el 7.º grado: se requiere 1 dosis de la vacuna Tdap si han pasado al menos 5 años desde la última dosis de una vacuna que contenga tétanos. Para los grados de 8.º-12.º: se requiere 1 dosis de la vacuna Tdap si han pasado 10 años desde la última dosis de una vacuna que contenga tétanos y difteria. La vacuna Td es aceptable en lugar de la vacuna Tdap si existe una contraindicación médica con respecto a la vacuna contra la pertusis.
Polio ¹	4 dosis o 3 dosis	4 dosis o 3 dosis	4 dosis o 3 dosis	4 dosis o 3 dosis	4 dosis de la vacuna contra la polio; debe recibirse una dosis en o después del 4.º cumpleaños. Sin embargo, con 3 dosis se cumple con el requisito si la 3.ª dosis se recibió en o después del 4.º cumpleaños.
Sarampión, paperas y rubéola ^{1,2} (MMR)	2 dosis	2 dosis	2 dosis	2 dosis	La primera dosis de la vacuna MMR debe recibirse en o después del 1.º cumpleaños. Para el kinder-2.º grado, se requieren 2 dosis de la vacuna MMR. Para los grados de 3-12.º, se requieren 2 dosis de una vacuna que contenga sarampión, y una dosis de la vacuna contra la rubéola y una de la vacuna contra las paperas.
Hepatitis B ²	3 dosis	3 dosis	3 dosis	3 dosis	Los estudiantes de 11-15 años de edad, con 2 dosis cumplen con el requisito si recibieron la vacuna contra la hepatitis B para adultos (Recombivax). Deben documentarse claramente la dosis y el tipo de vacuna. (Dos dosis de 1.0 mg./1.0 ml. de Recombivax).
Varicela ^{1,2,3}	2 dosis	1 dosis	2 dosis	1 dosis	La primera dosis de la vacuna contra la varicela debe recibirse en o después del 1.º cumpleaños. Para el kinder-2.º y 7.º-9.º grado, se requieren 2 dosis. Se requiere 1 dosis para todos los demás niveles de grado. Se requieren 2 dosis para todos los estudiantes que reciban la primera dosis en o después de los 13 años de edad.
Meningocócica			1 dosis		
Hepatitis A ^{1,2}	2 dosis				La primera dosis de la vacuna contra la hepatitis A debe recibirse en o después del 1.º cumpleaños.

¹ Recibir la dosis hasta (e inclusive) 4 días antes del cumpleaños satisfará el requisito de vacunación para entrar a la escuela.

² La confirmación serológica de la inmunidad al sarampión, las paperas, la rubéola, la hepatitis B, la hepatitis A o la varicela o la evidencia serológica de infección son aceptables en lugar de la vacuna.

³ La enfermedad previa puede documentarse con una declaración escrita de un médico, una enfermera escolar o el padre o tutor del niño que diga algo como: "Esto es para verificar que (nombre del estudiante) tuvo varicela el (fecha) o por esa fecha y no necesita la vacuna contra la varicela". Dicha declaración escrita será aceptable en lugar de todas las dosis requeridas de la vacuna contra la varicela.